


Terapia de nutricional parenteral (TNP)



Essas informações não substituem o aconselhamento profissional. Portanto, siga as recomendações de seu médico, nutricionista, enfermeiro ou farmacêutico.

Visão geral

Com base no diagnóstico, seu prestador de serviços de saúde prescreveu nutrição parenteral para suprir suas necessidades nutricionais. Isso é conhecido como nutrição parenteral (NP) e é administrada por um cateter intravenoso (IV) colocado em uma veia grande. Os nutrientes e fluidos podem ser administrados diretamente pelo cateter em sua corrente sanguínea. Para obter os melhores resultados com a terapia, é importante que você faça a infusão de NP conforme prescrito por seu prestador de serviços de saúde. Entre em contato com o seu prestador de serviços de saúde e/ou farmacêutico da Option Care Health se apresentar febre, calafrios, falta de energia, náusea, palpitações cardíacas/frequência cardíaca acelerada, tontura, suor excessivo, diminuição da produção de urina ou qualquer outro sintoma incomum, ou se tiver dúvidas/preocupações relacionadas a essas instruções.

Preparação e administração da NP

Para ajudar a evitar infecções, lave bem suas mãos sempre que usar a via intravenosa ou administrar a NP por conta própria. A lavagem frequente das mãos ajuda a evitar que bactérias e germes entrem no cateter, na NP e nos suprimentos.

Remova sua bolsa de NP do refrigerador de 2 a 4 horas antes da administração para permitir que ela aqueça à temperatura ambiente. NUNCA acelere o processo de aquecimento inserindo as soluções no micro-ondas ou deixando sua bolsa perto de fontes de calor ou luz solar direta.

Limpe o seu tapete para preparação de NP da Option Care Health e use-o como guia.

Reúna os seguintes suprimentos:

- Lenços umedecidos com álcool
- Seringas para lavagem
- Seringa com agulha(s) – 10 ml e outras conforme necessário para os aditivos
- Nutrientes, multivitaminas ou medicamentos (aditivos) a serem adicionados à bolsa de NP
- Tubo com filtro
- Bolsa de NP
- Bomba de infusão
- Recipiente para materiais perfurocortantes e/ou descarte

Antes de usar, inspecione a bolsa de NP e o rótulo. NÃO FAÇA A INFUSÃO e ligue para sua farmácia Option Care Health em qualquer um dos casos a seguir:

- Nome incorreto do paciente
- NP fora da data para descarte
- Rótulo não corresponde à prescrição atual
- Bolsa com partículas flutuantes, turva, separada, descolorida ou com vazamento

Como adicionar vitaminas à bolsa de NP

1. Lave suas mãos novamente antes de começar.
2. Coloque a bolsa em uma superfície limpa e plana usando o tapete para preparação de NP como guia.
3. Caso a sua bolsa de NP apresente uma tampa sobre a entrada de injeção, remova-a. Limpe a extremidade da entrada com um lenço umedecido com álcool por, ao menos, 15 SEGUNDOS e deixe secar naturalmente. NÃO deixe a entrada tocar outras superfícies após a sua limpeza com álcool.
4. Remova as tampas protetoras dos 2 frascos de vitaminas. Limpe as rolhas de borracha dos frascos com um lenço umedecido com álcool durante 15 SEGUNDOS e deixe secar naturalmente. (Fig. 1)
5. Remova seringa da embalagem. Sua seringa pode ou não ter uma agulha acoplada. Se tiver, gire a agulha suavemente para apertá-la. Se a seringa não tiver agulha conectada, remova a agulha de sua embalagem, conecte-a à seringa e gire suavemente.



Fig. 1

Como adicionar vitaminas à bolsa de NP (continuação)

6. Puxe o êmbolo da seringa lentamente até a marca de 2 ml a 3 ml.
7. Insira a agulha da seringa diretamente na rolha de borracha do primeiro frasco de vitamina e injete cuidadosamente de 2 a 3 ml de ar no frasco. Adicione o ar pouco a pouco. **NÃO** force o ar de uma vez. (Fig. 2)
8. Vire o frasco de vitamina de cabeça para baixo. Ajuste a agulha de forma que a ponta fique no líquido. Puxe lentamente todo o conteúdo para dentro da seringa, pouco a pouco. Tome cuidado para não encostar na agulha e evitar contaminação ou uma picada acidental. Repita o procedimento com o segundo frasco de vitamina, usando a mesma seringa. (Fig. 3)
9. Após de inserir os 2 frascos de vitamina na seringa, insira cuidadosamente a agulha diretamente na entrada de injeção da bolsa de NP para evitar perfurar a bolsa. Se a entrada de injeção entrar em contato com algo após a limpeza com álcool, será necessário limpar novamente e deixar secar naturalmente. Se qualquer parte da agulha tocar em algo que não seja a superfície do frasco, descarte a seringa, a agulha e a dose de vitamina e converse com o farmacêutico para substituição. Com seu polegar no êmbolo, injete lentamente as vitaminas na entrada de injeção da bolsa de NP conforme as instruções do seu enfermeiro. (Fig. 4)
10. **NÃO** coloque a tampa de volta nas agulhas das seringas. Descarte todas as seringas e agulhas usadas no recipiente fornecido de materiais perfurocortantes.
11. Massageie suavemente a bolsa de NP para misturar uniformemente as vitaminas à solução.
12. As vitaminas são um componente essencial da prescrição de NP e devem ser adicionadas a cada bolsa, a menos que haja instruções em contrário.
13. Se sua receita incluir outros aditivos, siga as mesmas instruções para adicioná-los à bolsa de NP.



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Como iniciar a infusão

1. Remova o tubo com filtro da embalagem e feche a presilha do tubo. Remova as tampas de ambas as pontas da entrada da bolsa de NP e do tubo. **NÃO** deixe que nenhuma das pontas tocar qualquer coisa após remover as tampas. Isso ajudará a evitar infecções.
2. Enquanto segura a entrada da ponta da NP com uma mão, empurre e torça a extremidade da ponta do tubo para dentro da entrada da bolsa com a outra mão. (Fig. 5)
3. Seu enfermeiro te ensinará como conectar a NP à bomba, preparar o tubo e verificar as configurações da bomba (que já está pré-programada para você). Você **DEVE** preparar o tubo antes de iniciar a terapia. (Fig. 6)
4. Limpe a extremidade da tampa de injeção sem agulha na ponta do cateter intravenoso com um lenço umedecido com álcool por, pelo menos, 15 SEGUNDOS e deixe secar naturalmente. Remova a tampa protetora da extremidade do tubo da bolsa de NP e conecte a tampa do local de injeção sem agulha na extremidade do seu cateter. Abra todas as presilhas no seu cateter e no tubo IV. Agora, você está pronto para iniciar a bomba conforme instruído. (Fig. 7)
5. Pendure a bolsa de NP no suporte para IV ou coloque na mochila da bomba para se mover durante a terapia. O alarme da bomba deve emitir um alerta quando a infusão estiver concluída.



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

Sua equipe da Option Care Health está disponível em tempo integral para ajudar você.



Escaneie o código QR para visualizar as instruções em vídeo e os recursos educacionais adicionais ou acesse optioncarehealth.com/education

