

抽取 药物

请参阅您的“患者输液治疗指南”
手册，了解额外信息。

本信息不旨在替代专业建议。
请始终遵照您的医生、护士或药剂师的建议。

概览

您将从小药瓶抽取药物，再注入静脉输液袋。

您将抽取：

• 药物：_____

药量：_____mL

• 药物：_____

药量：_____mL

准备开始


- 使用清洁的工作区域
- 使用抗菌肥皂和温水彻底清洁双手
(如果没有肥皂和水，请使用酒精洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

准备用品：

- A. 小药瓶/安瓿
- B. 带针头的注射器
- C. 过滤针头 (如果从安瓿中抽取)
- D. 酒精湿巾
- E. 锐器盒
- F. 其他 _____

从小药瓶抽取药物

- 1 | 从包装内取出注射器。
 - 2 | 取下小药瓶的塑料瓶盖。
- 小药瓶的外观会根据药物而有所不同。
- 3 | 用酒精湿巾擦拭小药瓶的顶部至少 **15 秒**，然后晾干。
 - 4 | 回拉注射器的柱塞，抽取 _____ mLs 的空气。
 - 5 | 取下针头护套。插入小药瓶 (直上直下，不要倾斜)。向小药瓶注入空气。(参阅图 1)
 - 6 | 将小药瓶倒置。调整针头，使针尖位于液体内。用注射器抽取需要的液体量。再三确认抽取的药物量。(参阅图 2)



- 7 | 从小药瓶拔下注射器，并小心地再盖回针头护套。
- 8 | 将多余的空气和液体排出，达到被指示的抽取量。
- 9 | 按照护士的指示将药物注射到静脉输液袋。
- 10 | 按照指示弃置用过的用品。

从安瓿抽取药物

- 1 | 将过滤针头拧到注射器上。**请勿**触碰针头或注射器的末端。
- 2 | 竖直拿握安瓿，轻弹顶部，散去顶部空间的溶液。(参阅图 3)
- 3 | 用酒精湿巾擦拭安瓿颈部。
- 4 | 将酒精湿巾缠绕在安瓿的颈部，拇指和食指抓住顶部。另一只手握住安瓿的底部。(参阅图 4)



图 3



图 4

- 5 | 手朝着远离您的方向用力，快速折断安瓿。如果安瓿不易折断，请稍微旋转，再试一次。
- 6 | 将包裹酒精湿巾的小药瓶头放在一边 (或放入锐器盒)。
- 7 | 向下倾斜约 20 度持握安瓿。
- 8 | 将过滤针头插入安瓿，小心不要触碰安瓿颈部的破损边缘。

- 9 | 将针头置于安瓿的底部，斜边向下。这将有助于用针头从安瓿抽出所有药物。(参阅图 5)



图 5

- 10 | 针头尖始终在液体里，同时抽取溶液。
- 11 | 从安瓿取出针头，小心地盖上过滤针头护套。
- 12 | 拔下过滤针头，随空的小药瓶弃置到锐器盒。
- 13 | 向有液体的注射器连接常规针头，不要触碰注射器末端。
- 14 | 将多余的空气和液体排出，达到被指示的抽取量。
- 15 | 按照护士的指示将药物注射到静脉输液袋。
- 16 | 按照指示弃置用过的用品。