

抽取藥物

請參閱您的「患者輸注治療指南」手冊，瞭解其他資訊。

本資訊目的不在取代專業建議。
請務必遵照醫師、護士或藥劑師的建議。

概覽

您將從小藥瓶抽取藥物，再注入 IV 靜脈輸注袋。

您將抽取：

• 藥物：_____

藥量：_____ mL

• 藥物：_____

藥量：_____ mL

準備開始


- 使用清潔的工作區域
- 使用抗菌肥皂和溫水徹底清潔雙手（如果沒有肥皂和水，請使用含酒精的手部滅菌劑）
- 用乾淨的毛巾擦乾雙手

準備用品：

- A. 小藥瓶/安瓿
- B. 帶針頭的注射器
- C. 過濾針頭（如果從安瓿抽取）
- D. 酒精擦拭布
- E. 尖銳物品容器
- F. 其他 _____

從小藥瓶抽取藥物


- 1 | 從包裝取出注射器。
 - 2 | 取下小藥瓶的塑膠瓶蓋。
- 小藥瓶的外觀會根據藥物而有所不同。
- 3 | 用酒精擦拭布擦拭小藥瓶的頂部至少 **15 秒**，然後風乾。
 - 4 | 回拉注射器的柱塞，抽取 _____ mL 空氣。
 - 5 | 取下針頭護套。插入小藥瓶（直上直下，不要傾斜）。注入空氣至小藥瓶。（參閱圖 1）
 - 6 | 倒置小藥瓶。調整針頭，使針尖位於液體內。用注射器抽取需要的液體量。再次確認抽取的藥物量。（參閱圖 2）



- 7 | 從小藥瓶拔下注射器，並小心蓋回針頭護套。
- 8 | 排出多餘的空氣和液體，達到指示的抽取量。
- 9 | 按照護士的指示將藥物注射到 IV 靜脈輸注袋。
- 10 | 按照指示棄置用過的用品。

從安瓿抽取藥物

- 1 | 將過濾針頭旋轉固定至注射器。**請勿**觸碰針頭或注射器的末端。
- 2 | 豎直拿握安瓿，輕彈頂部，散去頂部空間的溶液。(參閱圖 3)
- 3 | 用酒精擦拭布擦拭安瓿頸部。
- 4 | 用酒精擦拭布包住安瓿頸部，用拇指和食指抓住頂部。用另一隻手握住安瓿底部。(參閱圖 4)



- 9 | 將針頭置於安瓿底部，斜邊向下。這將有助於用針頭從安瓿抽出所有藥物。(參閱圖 5)



- 5 | 手朝著遠離您的方向，用力快速折斷安瓿。如果安瓿不易折斷，請稍微旋轉，再試一次。
- 6 | 用酒精擦拭布包裹小藥瓶頭部，放在一邊(或放入尖銳物品容器)。
- 7 | 向下傾斜約 20 度持握安瓿。
- 8 | 將過濾針頭插入安瓿，小心不要觸碰安瓿頸部的破損邊緣。
- 10 | 針尖保持在液體裡，同時抽取溶液。
- 11 | 從安瓿取出針頭，小心蓋上過濾針頭護套。
- 12 | 拔下過濾針頭，隨空的小藥瓶棄置於尖銳物品容器。
- 13 | 連接常規針頭至已填充的注射器，不要觸碰注射器末端。
- 14 | 排出多餘的空氣和液體，達到指示的抽取量。
- 15 | 按照護士的指示將藥物注射到IV靜脈輸注袋。
- 16 | 按照指示棄置用過的用品。