

Administração de medicamento via IV: IV em bolus

Essas informações não substituem o aconselhamento profissional. Portanto, siga as recomendações de seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.

Antes de usar

- Consulte o rótulo do medicamento para obter instruções sobre quando removê-lo do refrigerador
- **NUNCA** acelere o processo de aquecimento esquentando o medicamento no fogão ou micro-ondas
- Use uma área de trabalho limpa
- Lave bem as mãos com sabão e água morna por, pelo menos, **20 SEGUNDOS**
(se não tiver água e sabão disponíveis, use um desinfetante para mãos a base de álcool)
- Seque as mãos com uma toalha limpa

1 | Reúna os suprimentos e prepare o método SASH conforme as instruções:

- A. Método SASH (Veja a Fig. 1)
- B. Seringa de medicamento IV
- C. (2) Seringas com solução salina
- D. (1) Seringas com heparina *(se solicitado)*
- E. Lenços umedecidos com álcool
- F. Recipiente para materiais perfurocortantes e/ou recipiente de descarte




Fig. 1

2 | Inspeção a seringa de medicamento

Inspeção cada seringa de medicamento. Confira a etiqueta na seringa (Veja a Fig. 2) e verifique:

- A. Nome correto do paciente
- B. Nome correto do medicamento
- C. Volume/quantidade do medicamento
- D. Tempo necessário para aquecer o medicamento em temperatura ambiente
- E. “Data de validade” do medicamento

Cada seringa de medicamento não deve conter rachaduras, vazamentos, partículas flutuantes ou descoloração. Entre em contato seu enfermeiro ou farmacêutico se houver problemas com as seringas ou se alguma coisa no rótulo estiver incorreta.




Fig. 2

Para fins de demonstração, siga as instruções na sua SUA seringa de medicamento.



3 | Enxágue a linha IV com solução salina

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. *(Veja a Fig. 3)*
- B. Empurre o êmbolo da seringa com solução salina para romper o lacre.
- C. Remova a tampa protetora da seringa com solução salina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solução salina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma superfície suja.

- D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o êmbolo para remover o ar da seringa.
- E. Fixe a seringa com solução salina ao conector sem agulha no cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fiquem presos juntos. *(Veja a Fig. 4)*
- F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- G. Enxágue o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por **2-3 SEGUNDOS** e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

NÃO tente fazer a lavagem se encontrar resistência. Ligue para o seu enfermeiro ou farmacêutico

- H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- I. Remova a seringa com solução salina e descarte-a no recipiente de descarte após o uso.

4 | Administração de medicamento

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. *(Veja a Fig. 3)*
- B. Remova a tampa protetora da seringa de medicamento.
- C. Fixe firmemente a seringa de medicamento ao conector sem agulha no cateter IV. Use o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fique preso. *(Veja a Fig. 4)*
- D. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- E. Injete o medicamento conforme indicado na bula do medicamento.
- F. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- G. Remova a seringa de medicamento quando a dose prescrita tiver sido administrada e descarte-a no recipiente de lixo.



5 | Enxágue a linha IV com solução salina

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. *(Veja a Fig. 3)*
- B. Empurre o êmbolo da seringa com solução salina para romper o lacre.
- C. Remova a tampa protetora da seringa com solução salina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solução salina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma superfície suja.

- D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o êmbolo para remover o ar da seringa.
- E. Fixe a seringa com solução salina ao conector sem agulha no cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fiquem presos juntos. *(Veja a Fig. 4)*
- F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- G. Enxágue o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por **2-3 SEGUNDOS** e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

NÃO tente fazer a lavagem se encontrar resistência. Ligue para o seu enfermeiro ou farmacêutico

- H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- I. Remova a seringa com solução salina e descarte-a no recipiente de descarte após o uso.

6 | Enxágue a linha IV com heparina (se solicitado)

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. *(Veja a Fig. 3)*
- B. Empurre o êmbolo da seringa com heparina para romper o lacre.
- C. Remova a tampa protetora da seringa com heparina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com heparina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma superfície suja.

- D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o êmbolo para remover o ar da seringa.



6 | Enxágue a linha IV com heparina (se solicitado)

Continuação...

- E. Fixe a seringa com heparina ao conector sem agulha no cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fiquem presos juntos. *(Veja a Fig. 4)*
- F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- G. Enxágue o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por **2-3 SEGUNDOS** e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

**NÃO tente fazer a lavagem se encontrar resistência.
Ligue para o seu enfermeiro ou farmacêutico**

- H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- I. Remova a seringa com heparina e descarte-a no recipiente de descarte após o uso.

Ligue para seu enfermeiro ou médico caso tenha alguma dúvida ou preocupação

Sua equipe da Option Care Health está disponível em tempo integral para ajudar você



Para visualizar as instruções em vídeo e acessar recursos educacionais adicionais, acesse optioncarehealth.com/education.

As unidades da Option Care Health são credenciadas pela ACHC. Os números da HHA estão disponíveis para visualização em optioncarehealth.com.

©2022 Option Care Health, Inc. Todos os direitos reservados. 200CH11005-0422